

TENUE - HYGIENE

Lors de la pose

- Tenue professionnelle
- FRICITION à la solution hydro-alcoolique
- GANTS non stériles
- BETADINE® alcoolique et compresses stériles

Lors de l'administration de médicaments

- Tenue professionnelle
- FRICITION à la solution hydro-alcoolique
- Alcool 70° et compresses stériles

TRAÇABILITE



Onglet Surveillance



- TYPE de cathéter
- DATE (pose/retrait)
- SITE
- CALIBRE
- NOM OPERATEUR
- DATE (pansement)

MONTAGE ET RINÇAGE

CATHETER VEINEUX PERIPHERIQUE

GANTS stériles

Palpation du point d'insertion
Ponction échoguidée

Cas particulier



Fréquence de changement

TOUS LES 4 JOURS
(max. 7 jours sur prescription médicale)

Ligne principale
TOUS LES 4 JOURS
(96h)

TOUS LES JOURS
(24h)
Lignes secondaires

RETRAIT

- Dès qu'il n'est plus indiqué (réévaluation quotidienne)
- En cas de signes cliniques locaux d'infection ou d'obstruction
- Au bout de **96h**
- Au bout **d'une semaine** Sur prescription médicale



Vidéo de la pose du pansement

PANSEMENT



REFECTION
uniquement si souillé ou décollé

RINÇAGE PULSE

- SYSTEMATIQUE avant et après administration OU au moins 1 fois par poste
- SERINGUE Luer Lock de 10ML
- 10ML de base (NaCl 0,9% ou G5% si incompatibilités)

CAS PARTICULIERS

- Changement de toute la ligne (sauf prolongateur court et cathéter):
- Après chaque adm. de PSL
- 24h après Lipides
- 12h après Propofol